

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE CLERMONT-FERRAND

(Tél. 95-10 et 97-11, Postes 260 et 263)

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, HAUTE-VIENNE, PUY-DE-DOME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Cité Administrative d'Assas, rue Pélissier,
CLERMONT-FERRAND.

C. C. P. : CLERMONT-FERRAND 5503-17

ABONNEMENT ANNUEL

12 NF

Supplément n° 1 au Bulletin n° 19 d'Avril 1962.

A V E R T I S S E M E N T S . -

- A R B R E S F R U I T I E R S -

TAVELURE DU POMMIER. - Les premières projections d'ascospores (spores en provenance des périthèces, organes de conservation de cette maladie pendant l'hiver) ont eu lieu, dans la nature, avec la pluie du 3 avril.

Actuellement, des contaminations sont possibles sur les variétés ayant atteint ou dépassé le stade C 3. (consulter le tableau des stades phénologiques qui vous a été adressé).

Ces variétés doivent être traitées immédiatement.

Dans les autres vergers, il importera de mettre en place le premier traitement dès que les bourgeons atteindront ce stade critique (vu l'état actuel de maturité des périthèces, des attaques graves seront alors à redouter en cas de pluies).

TAVELURE DU POIRIER. - Étendre à tous les Poiriers le traitement précédemment conseillé. Renouveler ce traitement en début de semaine prochaine dans les vergers intéressés par notre note précédente. (Bulletin n° 19 du 4 Avril).

CECIDOMYIE DES POIRETTES. - Dans les vergers où des dégâts sont à craindre (après la nouaison, petites poires déformées contenant de nombreux vers), effectuer, par beau temps, un traitement très soigné (ce traitement peut être combiné avec celui dirigé contre la Tavelure).

I N F O R M A T I O N S . -

- A R B R E S F R U I T I E R S -

MONILIA DE L'ABRICOTIER. - Effectuer un autre traitement dès la chute des pétales.

C O L Z A

MELIGETHE. - Jusqu'alors, les conditions météorologiques n'ont pas permis de graves attaques.

Dès le prochain réchauffement, surveiller les cultures afin d'intervenir en temps utile, c'est-à-dire dès qu'il y aura quelques insectes par pied (nous rappelons que le Mèligèthe est seulement nuisible avant la floraison, dévorant les boutons floraux non ouverts).

N O T A . -

- Les premières éclosions de chenilles défoliatrices sur Cerisiers viennent d'être observées.

- Pour les Produits à utiliser contre les Ennemis des Cultures visés dans ce Bulletin, consulter la liste (Edition Spéciale) qui vous a été transmise.

Clermont-Ferrand, le 11 Avril 1962.

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles

A. LECLERC.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux

P. DENIZET.

Imprimerie de la Station de Clermont-Ferrand
Directeur-Gérant : L. BOUYX.

Tirage n° 391 du 11 Avril 1962 - 2.000 exemplaires - Abonnement 1962 : Expédition n° 4.

P40